

香港基督教服務處 幼兒教育服務

幼兒常見傳染病之常識

種類	發病季節	潛伏期	傳染途	症狀	病者隔離期	同居者應否隔離
腦膜炎	春季	2-10天	呼吸道	發熱，頭痛，嘔吐，甚至抽筋，皮膚有時可見有瘀斑點。	體溫正常，鼻咽分泌物培養無細菌生長。	集體兒童檢疫七天或鼻咽分泌物培養無菌生長，可考慮用磺胺藥預防
水痘	冬春季	14-24天	呼吸道 接觸	先有輕微傷風症狀，其後於頭皮、髮際等全身皮膚粘膜有胞疹，可化膿。	直至痘痂脫落為止。	集體兒童檢疫28天
霍亂	夏季	1-5天	消化道	腹痛，腹瀉，大便如米泔水狀，可伴嘔吐。	大便培養無細菌生長。	遵照醫生指示
白喉	秋冬季	2-10天	呼吸道	發熱，喉痛，聲嘶，咽、扁桃腺上有白膜。	咽部培養無細菌生長。	同上
痢疾	夏秋季	半天-8天	消化道	發熱，腹痛，腹瀉，大便呈膿血性。	大便培養無痢疾菌生長。	毋須隔離
傷寒（腸熱）	夏秋季	7-30天	消化道	持續發熱不退，腹脹或腹瀉，亦可有便秘。	直至醫生證明不傳染為止。	同上
風疹	春冬季	5-25天	呼吸道	發熱，傷風，全身有紅色皮疹，面部為多，枕後，耳淋巴腺腫大。	出疹日起七天。	同上
麻疹	春季	6-21天	呼吸道	症狀與上者相仿但較嚴重。	出疹後十天。	集體兒童檢疫14-21天
腮腺炎	冬春季	8-30天	呼吸道	發熱，耳下腫痛。	直至所有腫脹消退後七天。	集體兒童檢疫21天
小兒麻痺	夏秋季	7-35天	消化道 呼吸道	發熱後出現四肢不同程度麻痺。	直至醫生宣佈無傳染性。	三週
猩紅熱	冬春季	2-5天	呼吸道	發熱，喉痛，皮膚全身一片片紅色皮疹。	症狀消失，咽部培養無菌。	集體兒童檢疫7天
百日咳	春季	6-21天	呼吸道	陣咳連續拾數聲，面紅伴回聲及嘔吐。	由症狀出現後40天。	毋須檢疫
天花	春季	7-16天	呼吸道 接觸	發熱，全身尤其面部有水胞疹及化膿，頭面部為主。	直至醫生證明不傳染為止。	隔離16天
病毒性肝炎	秋冬季	10-15天	消化道	發熱，消化不良，嘔吐噁心，隨後出現黃疸，肝大，腹痛。	發病後四十天。	集體兒童檢疫21天
手足口病	夏季、初秋	3-7天	呼吸道 接觸	先有感冒症狀，其後可能連續發熱幾天，手、腳出現水泡或無痛紅疹，口腔內及舌旁會有疼痛的潰瘍。	直至醫生證明不傳染為止。	遵照醫生指示